Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

# ANTI HBC IgM

## Material de Coleta
1,0 mL de soro ou plasma (heparina, citrato de sódio ou EDTA).

## Preparo do paciente
Jejum de 4h.

## Descrição do Exame
Hepatite B Anticorpos anti core do virus da hepatite B HBV Anti-HBC IgM

## Método
Quimiolominescência.

## Consevação
Refigerado entre 2 e 8ºC:7 dias.

## Interferentes
Hemólise e lipemia acentuadas.

## Valor de Referência
Não reagente

## Interpretação
Os anticorpos IgM contra o antígeno central da hepatite B (IgM anti-HBc) surgem no início do quadro clínico da doença. Nos primeiros quatro meses, predominam os anticorpos da classe IgM e, depois desse prazo, os da classe IgG. No período entre a negativação do antígeno de superfície (HBsAg) e a positivação do anticorpo anti-HBs, ou seja, na chamada janela imunológica, o anti-HBc pode ser o único marcador de infecção positivo. O fato é que um resultado positivo deste exame indica infecção aguda pelo VHB ou, mais raramente, infecção crônica com alto grau de replicação.

## Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.