Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

TOXOPLASMOSE, AVIDEZ IgG

Material de Coleta
1,0 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum de 8h.

Descrição do Exame
AFINIDADE DE IGG PARA TOXOPLASMOSE AVIDEZ DE IGG P/ TOXOPLASMOSE AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE ESTABELECER PERIODO PROVAVEL DE INFECCAO TESTE DE AVIDEZ IGG P/TOXOPLASMOSE TOXOPLASMOSE, AVIDEZ DE IGG P/ TOXOPLASMOSE

Método
Enzimaimunoensaio.

Consevação
Refrigerado entre 2 e 8ºC: 7 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência
Fraca avidez: Índice menor que 0,200 Inconclusivo: Índice entre 0,200 e 0,300 Forte avidez: Índice maior que 0,300

Interpretação
É útil para confirmar se a toxoplasmose é aguda ou não, quando a reação para IgM se mostra positiva. Como algumas das metodologias utilizadas para a pesquisa de IgM apresentam grande sensibilidade, concentrações muito pequenas de anticorpos dessa classe podem ser detectadas por períodos tão longos como 8, 12, 16 meses ou até por mais tempo, após o início de uma infecção aguda. A determinação da porcentagem de avidez de IgG deve ser sugerida quando os índices de IgM obtidos pelas técnicas imunoenzimáticas ou de quimioluminescência forem positivas. Um índice de avidez de IgG menor que 0,200 sugere que a infecção seja aguda ou recente e que tenha ocorrido nos últimos três meses. Já um resultado com um índece maior que 0,300 é considerado uma forte avidez, em tal situação, os anticorpos IgM presentes são considerados como residuais, não existindo risco para o feto, em caso de gestantes. Por outro lado,índece entre 0,200 e 0,300 não permitem definir o provável período de ocorrência da toxoplasmose. O teste da avidez de IgG só deve ser solicitado diante de reação positiva para IgM, pois uma sorologia para toxoplasmose com reação negativa para IgM e IgG reagente,define que a infecção é pregressa.

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.