Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

HAV-IgM

Material de Coleta
1,0 mL de soro ou plasma (heparina, citrato de sódio ou EDTA).

Preparo do paciente
Jejum de 4h.

Descrição do Exame
ANTICORPOS IGM ANTI VIRUS DA HEPATITE ANTI HAV IGM ANTI-HAV + IGM ANTI-HEPATITE A C/PESQUISA DE IGM ANTICORPOS IgM CONTRA O VÍRUS A DA HEPATITE ANTICORPOS IGM DA HEPATITE TIPO A, PESQUISA ANTICORPOS IGM PARA HEPATITE A HEPATITE A, ANTICORPOS IgM HEPATITE A, ANTICORPOS IGM DA IGM HEPATITE A SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM

Método
Enzimaimunoensaio.

Consevação
Refrigerado entre 2 e 8ºC: 5 dias. Congelado a -20°C:15 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência
Não reagente.

Interpretação
Exame utilizado para o diagnóstico sorológico da Hepatite viral aguda do tipo A. O aparecimento na circulação de anticorpos anti-HAV IgM demonstra exposição recente ao vírus. Esses marcadores sorológicos já estão presentes cerca de uma semana antes do início do quadro clínico e continuam sendo encontrados até três meses depois da instalação da hepatite.

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.