Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

HCV

Material de Coleta
1,0 mL de soro ou plasma (EDTA).

Preparo do paciente
Jejum de 4h.

Descrição do Exame
ANTI HCV ANTI HCV TOTAL ANTI HVC ANTI VHC ANTI-VHC/ANTI-HCV ANTICORPOS ANTI VIRUS DA HEPATITE C ANTICORPOS HEPATITE C HCV, ANTICORPOS ANTI HEPATITE C SOROLOGIA PARA HEPATITE C VHC VIRUS C DA HEPATITE

Método
Enzimaimunoensaio.

Consevação
Refregerado entre 2 e 8ºC: 5 dias. Congelado a -20°C: 15 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência
Não reagente.

Interpretação
A presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C (anti-HCV), os quais podem surgir entre quatro e 12 meses após o contágio, indica contato prévio com o vírus, mas não define se a infecção é aguda, crônica ou se já foi curada, servindo apenas como um exame de triagem para a hepatite C. O diagnóstico de infecção aguda só pode ser feito com a soroconversão. Quando a pesquisa de anticorpos é positiva por teste imunoenzimático e não existem antecedentes epidemiológicos para justificar uma infecção prévia, recomenda-se a realização de um teste confirmatório pela técnica de Immunoblot (Riba 3,0) ou a pesquisa do vírus por técnica molecular (PCR).

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.