Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

CEA, ANTIGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO

Material de Coleta
Soro - 1 mL

Preparo do paciente
Jejum de 8 horas. Anotar a idade e uso de medicamentos.

Descrição do Exame
CEA Marcadores tumorais

Método
Quimioluminescência

Consevação
Refrigerado 2 a 8°C:7 Congelado -20°C:30 dias

Interferentes
Hemólise e lipemia intensa.

Valor de Referência
Homem adulto: Não fumante..... Até 3,4 ng/mL Fumante..... Até 6,2 ng/mL Mulher Adulta: Não fumante..... Até 2,5 ng/mL Fumante..... Até 4,9 ng/mL

Interpretação
É útil no monitoramento de câncer de cólon persistente, metastático ou recorrente após cirurgia; elevado em >30% dos pacientes com câncer de mama,pulmão, fígado, cólon, reto, estômago e adenocarcinomas do pâncreas. Determinação do prognóstico em pacientes com carcinoma de cólon. Elevado em: •Câncer.Contudo há grande superposição de valores nas doenças malignas e benignas. Portanto, concentração aumentada sugere mas não é diagnóstico de câncer. •Doenças inflamatórias não malignas ativas (principalmente do trato gastro intestinal, por ex., colite ulcerativa, enterite regional, diverticulite, úlcera péptica e pancreatite crônica) com freqüência são associadas a níveis elevados que diminuem quando a doença está em remissão. •Insuficiência renal. •Doença fibrocística da mama. •Fumo.

Setor
Endocrinologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.