Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

SCL-70

Material de Coleta
1 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum de 8 horas.

Descrição do Exame
DNA Topoisomerase I Anti Escleroderma Anti SCL70

Método
Hemaglutinação.

Consevação
Refrigerado entre 4 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemias acentuada.

Valor de Referência
Negativo.

Interpretação
Os anticorpos anti-SCL-70 são voltados contra a enzima DNA topoisomerase I e sua presença é considerada um marcador da esclerose sistêmica/ escleroderma, razão pela qual o exame tem utilidade no diagnóstico dessa doença. Os anticorpos são detectados em cerca de 20% a 30% dos pacientes, sobretudo naqueles com a forma difusa. Entretanto, a identificação do anti-SCL-70 não descarta a existência simultânea de outra condição auto-imune, a exemplo do lúpus eritematoso sistêmico e da síndrome de Sjögren. A presença de tais anticorpos está associada a envolvimento visceral mais proeminente, especialmente de pulmões e coração.

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.