Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

# HTLV 1 e 2

## Material de Coleta
1 mL de soro.

## Preparo do paciente
Jejum de 4 horas. Intervalo de mamadas para lactentes.

## Descrição do Exame
HTLV-1 e 2, sorologia para HTLV1 E HTLV2 por ELISA, pesquisa de anticorpos PARAPARESIA ESPÁSTICA TROPICAL
Pesquisa de anticorpos anti-HTLV 1/2 (ELISA)

## Método
Enzimaimunoensaio.

## Consevação
Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

## Interferentes
Hemólise e/ou lipemia acentuada.

## Valor de Referência
Negativo.

## Interpretação
O teste imunoenzimático é utilizado no rastreamento da infecção pelos vírus HTLV-1 e 2. Esses retrovírus, que são distintos do HIV-1 e do HIV-2, estão associados a infecção desprovida de alterações clínicas em 95% dos casos. Dos infectados, 5% podem evoluir para paraparesia espástica tropical (TSP/HAM) ou leucemia de células T do adulto. Para confirmar a positividade obtida no teste de rastreamento, há necessidade de realizar o teste de Western Blot específico para o HTLV, o qual também discrimina o tipo de vírus causador da infecção (HTLV-1 ou HTLV-2).

## Setor
Imunologia.

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.