Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

CAXUMBA,IgM

Material de Coleta
1 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame
Parotidite Paramixovirus Paramyxovirus

Método
Imunoenzimático.

Consevação
Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência
NEGATIVO : INDICE MENOR OU IGUAL A 0,90 INDETERMINADO: INDICE ENTRE 0,91 A 1,09 REAGENTE : INDICE MAIOR OU IGUAL A 1,10

Interpretação
A caxumba é causada por um paramyxovírus. A sorologia permite avaliar a resposta a infecção natural ou a imunização. A presença de anticorpos da classe IgM indica infecção recente, podendo ser detectados nos primeiros dias e mantendo-se por 1 a 3 meses. Em quadros crônicos, pós-vacinas ou de transferência de imunidade (filhos de mães imunes ou uso de gamaglobulina hiperimune), anticorpos IgM estão ausentes. Os anticorpos da classe IgG surgem logo após a IgM e mantém-se em níveis protetores de forma duradoura. Os recém-nascidos de mães imunizadas, naturalmente ou por vacinação, apresentam níveis protetores de IgG até cerca de 6 meses de idade.

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.