Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

DISMORFISMO ERITOCITÁRIO

Material de Coleta
Caso a mulher esteja menstruada, orientar a coleta após a fase menstrual. *Coletar toda a urina da manhã, preferencialmente a primeira (Garrafa).

Preparo do paciente
Evitar atividade física.

Descrição do Exame
Pesquisa de hemácias dismórficas na urina Dismorfismo eritocitário

Método
Microscópico.

Consevação
Temperatura ambiente 15 a 33°C: até 2 horas.

Interferentes
Volumes insuficientes, tempo de conservação superior ao preconizado. Atividade física.

Valor de Referência
Até 60 %.

Interpretação
A análise da morfologia das hemácias no sedimento urinário pode indicar se a origem da hematúria é glomerular(presença de acantócitos e/ou codócitos)ou não glomerular.A hematúria microscópica de forma isolada pode ser encontrada em 4% a 13% da população geral. A presença de acantócitos ou codócitos é indicativa de hematúria de origem glomerular.Indivíduos que não apresentam número significativo de hemácias no sedimento - menos de 5 por campo - deverão colher nova amostra, até que se obtenha uma amostra com número representativo, devido ao caráter, muitas vezes, transitório das hematúrias microscópicas.

Setor
Microbiologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.