Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

DENGUE

Material de Coleta
1,0 mL de soro

Preparo do paciente
Jejum de 4h.

Descrição do Exame
NS1 Anticorpos IgG para Dengue Anticorpos IgM para Dengue

Método
Imunocromatografia.

Consevação
Refrigerado entre 2 e 8ºC: 7 dias.

Interferentes
Lipemia e/ou hemólise acentuada.

Valor de Referência
Não reagente.

Interpretação
Teste utilizado para o diagnóstico da Dengue. A Dengue é uma infecção viral aguda caracterizada por início agudo de febre, dor de cabeça, dores musculares (em juntas e periorbitais) e rash cutâneo. Na dengue, muitas vezes o diagnóstico sorológico não é capaz de confirmar casos suspeitos com evolução grave, já que a febre hemorrágica pode ocorrer na janela imunológica, quando as pesquisas de IgM e IgG são negativas. Nesses casos, a pesquisa do antígeno NS1 apresenta sua melhor utilidade, permitindo o diagnóstico nos primeiros cinco dias de doença. Como há um período de sobreposição de positividade do antígeno NS1 e IgM, a pesquisa de ambos os marcadores simultaneamente aumenta a sensibilidade do teste, compensando a baixa positividade na pesquisa de anticorpos isoladamente nosprimeiros dias de infecção.

Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.