

CHAGAS - HEMAGLUTINAÇÃO

Material de Coleta

1,0 mL de soro ou plasma (citrato, heparina, oxalato ou EDTA).

Preparo do paciente

Jejum de 4h.

Descrição do Exame

Chagas Hemaglutinacao Passiva para Doença de Chagas(Qualitativo). T. Cruzi Tripanossoma Tripanosoma

Método

Hemaglutinação.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 7 dias.

Interferentes

Lipemia e/ou hemólise acentuada.

Valor de Referência

Não reagente.

Interpretação

Diagnóstico de infecção por Trypanosoma cruzi ou Doença de Chagas. Exame útil no diagnóstico da doença de Chagas ou para se verificar se um indivíduo foi infectado pelo Tripanossoma cruzi, o agente etiológico. Até o presente momento, não existe um teste que seja altamente específico e sensível para confirmar o diagnóstico. Por esta razão, mais de um teste é recomendável e valoriza-se, para fins diagnósticos, quando a pesquisa de anticorpos específicos é positiva em todos os testes utilizados. Quando a reação é positiva somente em um dos métodos, a valorização do resultado dependerá dos antecedentes epidemiológicos, exame físico e exames complementares como eletrocardiograma e RX. Em regiões endêmicas de leishmaniose, o resultado tem que ser avaliado com cuidado, pois há ocorrência de reações cruzadas entre antígenos dos dois parasitas.

Setor

Imunologia