Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

# RUBÉOLA , ANTICORPOS IgM

## Material de Coleta
1,0 mL de soro.

## Preparo do paciente
Jejum de 8h.

## Descrição do Exame
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS IGM PARA RUBEOLA IGM PARA RUBEOLA RUBEOLA, ANTICORPOS IGM

## Método
Quimioluminescência.

## Consevação
Refrigerado entre 2 e 8ºC: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

## Interferentes
Hemólise e/ou lipemia intensa.

## Valor de Referência
Não reagente.

## Interpretação
O exame é útil para identificar a infecção aguda pelo vírus da rubéola. Todavia, com a introdução de metodologias que permitem detectar mínimas concentrações de IgM anti-rubéola, os indivíduos podem apresentar reações positivas por períodos maiores que 12 meses após a doença ou a vacinação - e mesmo por um período de tempo maior. Dessa forma, hoje se entende que, principalmente para gestantes, um teste de IgM positivo não significa obrigatoriamente uma infecção aguda. Os anticorpos dessa classe, quando detectados meses depois do início da infecção, são considerados como residuais. Para saber o provável período da ocorrência da rubéola, a determinação da avidez da IgG tem sido de grande auxílio. Já no recém-nascido, uma reação positiva significa infecção congênita.

## Setor
Imunologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.