Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

PLAQUETAS

Material de Coleta
2,0 mL de Sangue total (EDTA).

Preparo do paciente
Jejum não necessario.

Descrição do Exame
Contagem de plaquetas

Método
Sistema automatizado por impedância.

Consevação
Refrigerado 2 a 8 °C:24 horas.

Interferentes
Hemólise

Valor de Referência
AMBOS OS SEXOS: - recém-nascido: 150.000 a 350.000/mm3; - 1 a 7 dias: 150.000 a 350.000/mm3; - 8 a 14 dias: 150.000 a 350.000/mm3; - 15 a 1 mês: 150.000 a 350.000/mm3; - 2 a 5 meses: 150.000 a 350.000/mm3; - 6 a 11 meses: 150.000 a 450.000/mm3; - 1 a 2 anos: 150.000 a 450.000/mm3; - 3 a 5 anos: 150.000 a 450.000/mm3; - 6 a 11 anos: 150.000 a 450.000/mm3; - 12 a15 anos: 150.000 a 450.000/mm3. ADULTOS: - maiores de 16 anos: 150.000 a 450.000/mm3.

Interpretação
O número de plaquetas está aumentado em doenças mieloproliferativas (trombocitemia essencial, policitemia vera, leucemia mielóide crônica, mielofibrose com metaplasia mielóide), inflamatórias (febre reumática, artrite reumatóide e colite ulcerativa) e malignas (carcinomas, doença de Hodgkin e outros linfomas). As plaquetopenias podem ser hereditárias, como ocorre nas síndrome de Wiskott-Aldrich, de Bernard-Soulier e de Fanconi, ou adquiridas, a exemplo dos casos de púrpura trombocitopênica idiopática secundária a doenças auto-imunes, anemias aplásticas e megaloblásticas e coagulopatias de consumo e medicamentosas, entre outras causas.

Setor
Hematologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.