GORDURA FECAL- PESQUISA

Material de Coleta
Fezes.

Preparo do paciente
O paciente deve colher as fezes sem uso de laxante e/ ou supositório e colocar o material em frasco sem conservante. A amostra não pode ser contaminada com urina nem deve ser colhida do vaso sanitário. O paciente não deve usar pomadas na região anal nas 24 horas que antecedem a coleta das fezes. Crianças que usam fralda, recomenda-se colher as amostras por meio de saquinhos do tipo 'coletores de urina' para impedir a absorção da gordura fecal pela fralda. O material pode ser entregue no próprio saquinho coletor. Se o paciente tiver utilizado contraste radiológico via oral, bismuto ou Metamucil®, a coleta de fezes deve ser realizada com um intervalo de 72 horas do uso dessas substâncias. Anotar na solicitação se o paciente tomou laxante. - Colocar a amostra de fezes em frasco sem conservante, volume mínimo

Descrição do Exame
Pesquisa de gordura fecal.

Método
Avaliação semi-quantitativa da gordura após coloração pelo Sudan III.

Consevação
Refrigerada 2 a 8°C: ate 12 horas após a coleta. Congelada (-20 ºC): 24 horas

Interferentes
Contraste radiológico; Pomada.

Valor de Referência
Negativo.

Interpretação
O aumento de gordura fecal esta associado com insuficiencia pancreatica exocrina, e o aumento de acidos graxos fecais esta associado com doença do intestino delgado.

Setor
Microbiologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.