

ÁCIDO ASCÓRBICO

Material de Coleta:

Soro Centrifugar imediatamente após a coleta e congelar. Proteger da luz. Temperatura ambiente não é aceitável.

Preparo do paciente:

Jejum de 8 horas.

Descrição do Exame:

Vitamina C Acido ascorbico

Método:

Cromatografia líquida de alta eficiência(HPLC)

Consevação:

Congelada -20C: 10 dias.

Interferentes:

Amostra descongelada e desprotegida da luz. Diminuído: Contraceptivos orais, Aspirina, Barbitúricos, Estrógenos, Metais pesados, Nitrosaminas e Paraldeido.

Valor de Referência:

0,4 a 1,5 mg/dL

Interpretação:

A dosagem de ácido ascórbico, ou vitamina C, é útil na avaliação nutricional e na detecção de estados de deficiência dessa vitamina. O ácido ascórbico está envolvido com o processo de maturação do colágeno, com a síntese de esteróides e com o catabolismo da tirosina. A deficiência de vitamina C causa o escorbuto, que ocasiona sangramento subperiosteal, gengival e subcutâneo, em decorrência da fragilidade do colágeno. Essa condição, no entanto, é atualmente bastante rara em decorrência da ampla oferta de alimentos contendo vitamina C. Ocasionalmente, porém, o escorbuto pode ser observado em indivíduos com hábitos alimentares muito inadequados, ou associado ao alcoolismo e à insuficiência renal.

Setor:

Toxicologia